

A/A	ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΟΝΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ			
1	Πλέγμα πολυπροπυλενίου σετ plug –κώνου με προσχηματισμένο πλέγμα με οπή (small, medium, large x-large), να έχει ελαστικότητα, να μην ξεφτίζει κατά το κόψιμο, και να μην ζαρώνει κατά την τοποθέτηση και κατά τη διαδικασία καθήλωσής του. small	20	
2	Πλέγμα πολυπροπυλενίου σετ plug –κώνου με προσχηματισμένο πλέγμα με οπή (small, medium, large x-large), να έχει ελαστικότητα, να μην ξεφτίζει κατά το κόψιμο, και να μην ζαρώνει κατά την τοποθέτηση και κατά τη διαδικασία καθήλωσής του. medium	100	
3	Πλέγμα πολυπροπυλενίου σετ plug –κώνου με προσχηματισμένο πλέγμα με οπή (small, medium, large x-large), να έχει ελαστικότητα, να μην ξεφτίζει κατά το κόψιμο, και να μην ζαρώνει κατά την τοποθέτηση και κατά τη διαδικασία καθήλωσής του. large	100	
4	Πλέγμα πολυπροπυλενίου σετ plug –κώνου με προσχηματισμένο πλέγμα με οπή (small, medium, large x-large), να έχει ελαστικότητα, να μην ξεφτίζει κατά το κόψιμο, και να μην ζαρώνει κατά την τοποθέτηση και κατά τη διαδικασία καθήλωσής του. X-Large	30	
5	Πλέγμα αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση κήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου κατηλωτικού εργαλείου (κλιπ) με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m ² προ απορρόφησης των άγκιστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m ² . Διάσταση 15X15 CM +/-10%	50	
6	Μακροπορώδες πλέγμα πολυπροπυλενίου, μη απορροφήσιμο με στρογγυλεμένες άκρες μεσαίου βάρους. Διάσταση πόρων 2.3mm * 1.5mm βάρος 55gsm, πάχος 0.60mm. Τάση 98.06N/cm ² . Διάσταση 15X15 CM +/-10%	30	
7	Μακροπορώδες πλέγμα πολυπροπυλενίου, μη απορροφήσιμο με στρογγυλεμένες άκρες μεσαίου βάρους. Διάσταση πόρων 2.3mm * 1.5mm βάρος 55gsm, πάχος 0.60mm. Τάση 98.06N/cm ² . Διάσταση 30X30 CM +/-10%	30	
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ			
8	Πλέγμα διπλής όψεως για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου 1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m ² , με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m ² και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο έκπτυξης από PGLA. Διάσταση 4,6 cm +/-10%	10	
9	Πλέγμα διπλής όψεως για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου 1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m ² , με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m ² και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο έκπτυξης από PGLA. Διάσταση 6,6 cm +/-10%	40	

10	Πλέγμα διπλής όψεως για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου 1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m ² , με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m ² και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο έκπτυξης από PGLA. Διάσταση 8,6 cm+/-10%	40	
11	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμψηκτική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με έξτρα χρωματιστή πράσινη περιμετρική θήκη - πτερύγιο από δισδιάστατο πολυεστέρα καθήλωσης και ελέγχου, με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,9mm βάρους 60gr/m ² , στο άνω μέρος του πλέγματος. Διάσταση 15X10 CM +/-10%	5	
12	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμψηκτική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με έξτρα χρωματιστή πράσινη περιμετρική θήκη - πτερύγιο από δισδιάστατο πολυεστέρα καθήλωσης και ελέγχου, με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,9mm βάρους 60gr/m ² , στο άνω μέρος του πλέγματος. Διάσταση 20X15 CM +/-10%	5	
13	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμψηκτική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με έξτρα χρωματιστή πράσινη περιμετρική θήκη - πτερύγιο από δισδιάστατο πολυεστέρα καθήλωσης και ελέγχου, με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,9mm βάρους 60gr/m ² , στο άνω μέρος του πλέγματος. Διάσταση 25X20 CM +/-10%	5	
14	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμψηκτική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με έξτρα χρωματιστή πράσινη περιμετρική θήκη - πτερύγιο από δισδιάστατο πολυεστέρα καθήλωσης και ελέγχου, με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,9mm βάρους 60gr/m ² , στο άνω μέρος του πλέγματος. Διάσταση 30X20 CM +/-10%	3	
15	Πλέγμα διπλής όψεως από πολύκλωνο πολυεστέρα και απορροφήσιμο αντισυμψηκτικό φιλμ από μείγμα κολλαγόνου, γλυκερόλης και πολυαιθυλενογλυκόλης για αποκατάσταση διαφραγματοκήλης, με μέγεθος πόρου 2,0mm x 2,6mm και βάρος 88gr/m ² , σε διάσταση 8,5x8cm , σε σχήμα πέταλου.	5	
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΟΝΟΚΗΛΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ			
16	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. Προσχηματισμένο 13,5X6	30	

17	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. Προσχηματισμένο 13X8	30	
18	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. Διάσταση 11X6	10	
19	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. Διάσταση 15X10	10	
20	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. Διάσταση 15X15	10	
21	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm. Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. Διάσταση 30X30	5	
22	Λαπαροσκοπικό πλέγμα βουβωνοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο βάρους 90γρ/τ.ε, πόρους διαμέτρου 1,1x1,6mm, που επιτρέπουν υψηλή ορατότητα στον χειρουργό, βελτιώνοντας παράλληλα την ανάπτυξη του ιστού. Το πλέγμα να διαθέτει ανατομική τρισδιάστατη δομή και ευρεία επιφάνεια που καλύπτει πλήρως την μέση κατώτερη βουβωνική χώρα προσφέροντας ταυτόχρονα προσχηματισμένο πτερύγιο χωρίς στεγανοποίηση για την καλύτερη εφαρμογή του. Ο ειδικός σχεδιασμός στην πλέξη όσο και στην στεγανοποίηση της υπόλοιπης περιμέτρου, προσφέρει στο πλέγμα τη δυνατότητα να εκπύσσεται άμεσα μετά την εισαγωγή του από το τροκάρ. Τέλος το πλέγμα διαθέτει σήμανση προσανατολισμού για την υπόδειξη της μέσης γραμμής (ML). Διάσταση 15X10 CM +/-10% αριστερό	50	

23	Λαπαροσκοπικό πλέγμα βουβωνοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο βάρους 90gr/τ.ε, πόρους διαμέτρου 1,1x1,6mm, που επιτρέπουν υψηλή ορατότητα στον χειρουργό, βελτιώνοντας παράλληλα την ανάπτυξη του ιστού. Το πλέγμα να διαθέτει ανατομική τρισδιάστατη δομή και ευρεία επιφάνεια που καλύπτει πλήρως την μέση κατώτερη βουβωνική χώρα προσφέροντας ταυτόχρονα προσχηματισμένο πτερύγιο χωρίς στεγανοποίηση για την καλύτερη εφαρμογή του. Ο ειδικός σχεδιασμός στην πλέξη όσο και στην στεγανοποίηση της υπόλοιπης περιμέτρου, προσφέρει στο πλέγμα τη δυνατότητα να εκπτύσσεται άμεσα μετά την εισαγωγή του από το τροκάρ. Τέλος το πλέγμα διαθέτει σήμανση προσανατολισμού για την υπόδειξη της μέσης γραμμής (ML). Διάσταση 15X10 CM +/-10% δεξι	50	
24	Αυτοκαθλούμενο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα με απορροφήσιμες ακίδες πολυγαλακτικού οξέος και απορροφήσιμο αντισυμφητικό φιλμ κολλαγόνου, με μέγεθος πόρου 1,8mm x 1,7mm και βάρος 81gr/m² προ απορρόφησης και 47gr/m² μετά την απορρόφηση των ακίδων, για αποκατάσταση λαπαροσκοπικής βουβωνοκήλης. Διάσταση 15X10 CM +/-10%	10	
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ			
25	Ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο μακροπορώδες πλέγμα δύο στρωμάτων, αποτελούμενο από πολυπροπυλένιο κατά 80% και αντικολλητικό πολυλακτίδιο-καπρολακτόνη κατά 20%, με μπλεγραμμές ένδειξης, προστατευτική αντισυμφητική διάφανη μεμβράνη και απορρόφηση από 90 έως 120 μέρες. Να έχει ειδικούς πόρους αποστράγγισης προς αποφυγή σερώματος. Διάσταση πόρων 1.8mm*2.0mm, πάχος 0.5mm-0.6mm, Βάρος 185gsm πριν απορρόφηση, 40gsm μετά απορρόφηση. Τάση 350 N πριν την απορρόφηση, 330 N μετά την απορρόφηση. Διάσταση (15cm X 15cm τετράγωνο)	5	
26	Ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο μακροπορώδες πλέγμα δύο στρωμάτων, αποτελούμενο από πολυπροπυλένιο κατά 80% και αντικολλητικό πολυλακτίδιο-καπρολακτόνη κατά 20%, με μπλε γραμμές ένδειξης, προστατευτική αντισυμφητική διάφανη μεμβράνη και απορρόφηση από 90 έως 120 μέρες. Να έχει ειδικούς πόρους αποστράγγισης προς αποφυγή σερώματος. Διάσταση πόρων 1.8mm*2.0mm, πάχος 0.5mm-0.6mm, Βάρος 185gsm πριν απορρόφηση, 40gsm μετά απορρόφηση. Τάση 350 N πριν την απορρόφηση, 330 N μετά την απορρόφηση. Διάσταση (20cm X 25cm οβάλ)	2	
27	Ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο μακροπορώδες πλέγμα δύο στρωμάτων, αποτελούμενο από πολυπροπυλένιο κατά 80% και αντικολλητικό πολυλακτίδιο-καπρολακτόνη κατά 20%, με μπλε γραμμές ένδειξης, προστατευτική αντισυμφητική διάφανη μεμβράνη και απορρόφηση από 90 έως 120 μέρες. Να έχει ειδικούς πόρους αποστράγγισης προς αποφυγή σερώματος. Διάσταση πόρων 1.8mm*2.0mm, πάχος 0.5mm-0.6mm, Βάρος 185gsm πριν απορρόφηση, 40gsm μετά απορρόφηση. Τάση 350 N πριν την απορρόφηση, 330 N μετά την απορρόφηση. Διάσταση (7.6cm X 15cm ορθογώνιο)	5	

28	Ενδοπεριτοναικό ημιαπορροφήσιμο μακροπορώδες πλέγμα δύο στρωμάτων, αποτελούμενο από πολυπροπυλένιο κατά 80% και αντικολλητικό πολυλακτίδιο-καπρολακτόνη κατά 20%, με μπλε γραμμές ένδειξης, προστατευτική αντισυμφητική διάφανη μεμβράνη και απορρόφηση από 90 έως 120 μέρες. Να έχει ειδικούς πόρους αποστράγγισης προς αποφυγή σερώματος. Διάσταση πόρων 1.8mm*2.0mm, πάχος 0.5mm-0.6mm, Βάρος 185gsm πριν απορρόφηση, 40gsm μετά απορρόφηση. Τάση 350 N πριν την απορρόφηση, 330 N μετά την απορρόφηση. Διάσταση (10cm X 15cm οβάλ)	5	
29	Ενδοπεριτοναικό ημιαπορροφήσιμο μακροπορώδες πλέγμα δύο στρωμάτων, αποτελούμενο από πολυπροπυλένιο κατά 80% και αντικολλητικό πολυλακτίδιο-καπρολακτόνη κατά 20%, με μπλε γραμμές ένδειξης, προστατευτική αντισυμφητική διάφανη μεμβράνη και απορρόφηση από 90 έως 120 μέρες. Να έχει ειδικούς πόρους αποστράγγισης προς αποφυγή σερώματος. Διάσταση πόρων 1.8mm*2.0mm, πάχος 0.5mm-0.6mm, Βάρος 185gsm πριν απορρόφηση, 40gsm μετά απορρόφηση. Τάση 350 N πριν την απορρόφηση, 330 N μετά την απορρόφηση. Διάσταση (15cm X 20cm οβάλ)	2	
30	Ενδοπεριτοναικό ημιαπορροφήσιμο μακροπορώδες πλέγμα δύο στρωμάτων, αποτελούμενο από πολυπροπυλένιο κατά 80% και αντικολλητικό πολυλακτίδιο-καπρολακτόνη κατά 20%, με μπλε γραμμές ένδειξης, προστατευτική αντισυμφητική διάφανη μεμβράνη και απορρόφηση από 90 έως 120 μέρες. Να έχει ειδικούς πόρους αποστράγγισης προς αποφυγή σερώματος. Διάσταση πόρων 1.8mm*2.0mm, πάχος 0.5mm-0.6mm, Βάρος 185gsm πριν απορρόφηση, 40gsm μετά απορρόφηση. Τάση 350 N πριν την απορρόφηση, 330 N μετά την απορρόφηση. Διάσταση (15cm X 20cm ορθογώνιο)	2	
31	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος. με προ-τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμίδιο ευκρινούς χρώματος. Διάσταση 12 CM +/-10% Στρογγυλό	3	
32	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος. με προ-τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμίδιο ευκρινούς χρώματος. Διάσταση 15X10 CM +/-10%	3	
33	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος. με προ-τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμίδιο ευκρινούς χρώματος. Διάσταση 15 CM +/-10% Στρογγυλό	3	

34	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος. με προ-τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμίδιο ευκρινούς χρώματος. Διάσταση 20X12 CM +/- 10%	3	
35	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m ² και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος. με προ-τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμίδιο ευκρινούς χρώματος. Διάσταση 20X15 CM +/- 10%	3	
36	Ενδοπεριτοναϊκό Υβριδικό εμφάλωμα 3 στρωμάτων για την αποκατάσταση κοιλιοκήλης, ομφαλοκήλης και μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Να αποτελείται από 3D PGA:TMC απορροφήσιμο πλεκτό ικρίωμα, μακροπορόδες πλεκτό πλέγμα από PTFE μη απορροφήσιμο και απορροφήσιμο φιλμ από PGA:TMC. (πολυγλυκολικό οξύ / ανθρακικό τριμεθυλένιο). Διάσταση 15 cm x 20 cm οβάλ.	1	
37	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη (trilysine) και ενεργή πολύ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση κτλ.). Διάσταση 5X10 cm	10	
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ			
38	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης. Κατασκευασμένο από 35% πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και 65% πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό από 2 ξεχωριστά εύκαμπτα τμήματα, το καθένα με μια ημικυκλική εγκοπή, τα οποία «αγκαλιάζουν» περιμετρικά τον οισοφάγο, με επιπλέον ενισχυμένη πλέξη 3 στρωμάτων. Τοποθετείται με κόλλα χωρίς ράμματα. Μέγεθος πόρου: 2 X 3 mm. Δομή: Μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Απορροφάται μετά από 90-120 ημέρες. Βάρος (πριν την απορρόφηση):85g/m2. Βάρος (μετά την απορρόφηση):28g/m2 Διαστάσεις: 6X5CM+6X5CM SMALL		
39	Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης. Κατασκευασμένο από 35% πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και 65% πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). Διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό από 2 ξεχωριστά εύκαμπτα τμήματα, το καθένα με μια ημικυκλική εγκοπή, τα οποία «αγκαλιάζουν» περιμετρικά τον οισοφάγο, με επιπλέον ενισχυμένη πλέξη 3 στρωμάτων. Τοποθετείται με κόλλα χωρίς ράμματα. Μέγεθος πόρου: 2 X 3 mm. Δομή: Μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική απαλότητα για άνεση των ασθενών. Απορροφάται μετά από 90-120 ημέρες. Βάρος (πριν την απορρόφηση):85g/m2. Βάρος (μετά την απορρόφηση):28g/m2 Διαστάσεις: 6X6CM+6X6CM LARGE		

40	Απορροφήσιμο εμβάλωμα αναδόμησης τοιχωμάτων & ιστών βιοαπορροφήσιμο 100%, από πολυγλυκολικό οξύ/ανθρακικό τριμεθυλένιο (PGA/TMC),προορίζεται για χρήση στην ενίσχυση των μαλακών ιστών, μέσης στήριξης, απορροφάται σε 6 μήνες. Διατίθεται και προσχηματισμένο για διαφραγματοκήλη (hiatal hernia). Διάσταση FLAT SHEET 7 X 10 CM - 1PK (ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ).	5	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ		
41	Αυτοπροσκολλούμενο πλέγμα πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης και στην μία επιφάνεια. Με μέγεθος πόρων 1,2mm . Διάρκεια παραμονής μέχρι 14 ημέρες. Κατάλληλο για εγκαύματα και σταθεροποίηση δερματικών μοσχευμάτων. Διάσταση 7,5x10cm	100	
42	Αυτοπροσκολλούμενο πλέγμα πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης και στην μία επιφάνεια. Με μέγεθος πόρων 1,2mm . Διάρκεια παραμονής μέχρι 14 ημέρες. Κατάλληλο για εγκαύματα και σταθεροποίηση δερματικών μοσχευμάτων. Διάσταση 10x18cm	100	
43	Αυτοπροσκολλούμενο πλέγμα πολυουρεθάνης με επίστρωση μαλακής σιλικόνης και στην μία επιφάνεια. Με μέγεθος πόρων 1,2mm . Διάρκεια παραμονής μέχρι 14 ημέρες. Κατάλληλο για εγκαύματα και σταθεροποίηση δερματικών μοσχευμάτων. Διάσταση 17x25cm	50	
44	Αυτοπροσκολλούμενο πλέγμα πολυεστέρα, λεπτό και εύκαμπτο, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης στην μία επιφάνεια, χωρίς φαρμακευτικές ουσίες, με διάτρητη επιφάνεια για αποτελεσματική ροή του εξιδρώματος. Με μέγεθος πόρων 1,2mm . Διάρκεια παραμονής μέχρι 14 ημέρες. Κατάλληλο για εγκαύματα και σταθεροποίηση δερματικών μοσχευμάτων. Διάσταση 7,5x10cm	100	
45	Αυτοπροσκολλούμενο πλέγμα πολυεστέρα, λεπτό και εύκαμπτο, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης στην μία επιφάνεια, χωρίς φαρμακευτικές ουσίες, με διάτρητη επιφάνεια για αποτελεσματική ροή του εξιδρώματος. Με μέγεθος πόρων 1,2mm . Διάρκεια παραμονής μέχρι 14 ημέρες. Κατάλληλο για εγκαύματα και σταθεροποίηση δερματικών μοσχευμάτων. Διάσταση 10x18cm	100	
	ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ		
46	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος 5mm για χρήση σε ανοικτή και λαπαροσκοπική επέμβαση κήλης, με προφορτωμένα κλιπ σε μορφή απορροφήσιμης βίδας από πολυλακτιδογλυκόλη - PLGA ύψους 5.16mm και πλάτους 5,08mm, με μήκος στειλεού 36cm. Το κλιπ παραμένει στο σώμα έως και 26 εβδομάδες, η τάση διατηρείται τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Σε δύο τύπους με 15 και 30 προφορτωμένα κλιπ αντίστοιχα.	10	
47	Συσκευή συρραφής με ασύμμετρες αντίρροπες ακίδες μονής κατεύθυνσης και εγκοπή διπλής γωνίωσης, η οποία προσφέρει ισχυρή αγκίστρωση διατηρώντας την ακεραιότητα της ισχύος του νήματος, βραδείας απορρόφησης από Γλυκολικό οξύ, και Τρυμεθυλένη Καρβονάτη. Διαθέτει αντοχή στην τάση, περίπου 75% στις 14 ημέρες, και περίπου 50% στις 28 ημέρες. Ολική απορρόφηση μέσω υδρόλυσης σε περίπου 180 ημέρες. Συσκευή πράσινου χρώματος με μία βελόνη καμπυλότητας 1/2 κύκλου με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, στην μία άκρη του, και θηλειά στην άλλη άκρη του. Βελόνη 27mm με ράμμα No 2/0, μήκος 15 εκ.	35	

48	Συσκευή συρραφής με ασύμμετρες αντίρροπες ακίδες μονής κατεύθυνσης και εγκοπή διπλής γωνίωσης, η οποία προσφέρει ισχυρή αγκίστρωση διατηρώντας την ακεραιότητα της ισχύος του νήματος, βραδείας απορρόφησης από Γλυκολικό οξύ, και Τρυμεθυλένη Καρβονάτη. Διαθέτει αντοχή στην τάση, περίπου 75% στις 14 ημέρες, και περίπου 50% στις 28 ημέρες. Ολική απορρόφηση μέσω υδρόλυσης σε περίπου 180 ημέρες. Συσκευή πράσινου χρώματος με μία βελόνη καμπυλότητας 1/2 κύκλου με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, στην μία άκρη του, και θηλειά στην άλλη άκρη του. Βελόνη 27mm με ράμμα Νο 3/0, μήκος 15 εκ.	35	
49	Συσκευή συρραφής με ασύμμετρες αντίρροπες ακίδες μονής κατεύθυνσης και εγκοπή διπλής γωνίωσης, η οποία προσφέρει ισχυρή αγκίστρωση διατηρώντας την ακεραιότητα της ισχύος του νήματος, βραδείας απορρόφησης από Γλυκολικό οξύ, και Τρυμεθυλένη Καρβονάτη. Διαθέτει αντοχή στην τάση, περίπου 75% στις 14 ημέρες, και περίπου 50% στις 28 ημέρες. Ολική απορρόφηση μέσω υδρόλυσης σε περίπου 180 ημέρες. Συσκευή πράσινου χρώματος με μία βελόνη καμπυλότητας 1/2 κύκλου με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, στην μία άκρη του, και θηλειά στην άλλη άκρη του. Βελόνη 17mm με ράμμα Νο 2/0, μήκος 15 εκ.	35	
50	Συσκευή συρραφής με ασύμμετρες αντίρροπες ακίδες μονής κατεύθυνσης και εγκοπή διπλής γωνίωσης, η οποία προσφέρει ισχυρή αγκίστρωση διατηρώντας την ακεραιότητα της ισχύος του νήματος, βραδείας απορρόφησης από Γλυκολικό οξύ, και Τρυμεθυλένη Καρβονάτη. Διαθέτει αντοχή στην τάση, περίπου 75% στις 14 ημέρες, και περίπου 50% στις 28 ημέρες. Ολική απορρόφηση μέσω υδρόλυσης σε περίπου 180 ημέρες. Συσκευή πράσινου χρώματος με μία βελόνη καμπυλότητας 1/2 κύκλου με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, στην μία άκρη του, και θηλειά στην άλλη άκρη του. Βελόνη 17mm με ράμμα Νο 3/0, μήκος 15 εκ.	35	
51	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοικτή χρήση. Να διαθέτει εύκαμπτο στειλεό 5mm για περισσότερη λειτουργικότητα και μήκος 36 εκ, και να φέρει 30 απορροφήσιμα κλιπ ολικού ύψους 5,1mm, ωφέλιμου ύψους 4,1mm από PG LA σε σχήμα βίδας με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια και με δυνατότητα κάμψης του στειλεού 3cm, ο στειλεός να έχει αριθμημένη κλίμακα σε cm.	40	
52	Λαπαροσκοπικό καθηλωτικό ατραυματικής καθήλωσης πλέγματος και συγκόλλησης περιτόναιου, πιστολοειδούς σχήματος, με διάμετρο στυλεού 5 mm και μήκους 35,5 cm, με εφαρμογή κυανοακρυλικής κόλλας (n-butyl-2-cyanocrylate), ενσωματωμένη στην συσκευή με ειδικό αποστειρωμένο φιαλίδιο, χαμηλής εξωθερμικής αντίδρασης <20 °C, με χρόνο πολυμερισμού εντός 10", με ένδειξη δοσομετρητή και αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, άνω των 33 δόσεων.	5	
53	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ		
53.1	Επαναφορτιζόμενο ενδοσκοπικό εργαλείο καθήλωσης πλέγματος μίας χρήσης. Διαθέτει στειλεό 5mm αρθρούμενο 65°. Φέρει 30 απορροφήσιμα κλιπ από PG LA σε σχήμα βίδας ύψους 5,1mm με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια και ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης.	1	

53. 2	Ανταλλακτική κεφαλή εργαλείου καθήλωσης πλέγματος με 10 απορροφήσιμα κλιπ PGLA σε σχήμα βίδας ύψους 5,1mm με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια και ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθούν προσφορές και για τα 2 παραπάνω ζητούμενα είδη. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ομάδας Α.	1	
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:		
	1. Σε όλα τα υλικά να περιλαμβάνεται το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου μεταφρασμένο στα ελληνικά.		
	2. Τα μοσχεύματα/ πλέγματα να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark. Απαιτούνται δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για το κάθε είδος.		
	3. Η Ημερομηνία λήξεως των μοσχευμάτων/πλεγμάτων να είναι τουλάχιστον 2 ετών.		
	4. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.		
	5. Κατάλογος πελατών (Νοσοκομεία που προμηθεύονται τα είδη).		
	6. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά) όπως επίσης CE, ISO και DOC της κατασκευάστριας εταιρείας.		
	7. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για τη διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.		
	8. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση της προς την αναθέτουσα αρχή που να αναφέρει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της κατασκευάστριας ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι της την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.		